

- METEOR -

SI ABBATTE SUGLI INSETTI DANNOSI



- ★ **INSETTICIDA PIRETROIDE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE**
- ★ **FORMULAZIONE FLOWABLE CON ELEVATA MICRONIZZAZIONE**
- ★ **BREVE INTERVALLO DI SICUREZZA SU NUMEROSE COLTURE**
- ★ **PERFETTA SELETTIVITÀ SULLE COLTURE TRATTATE**



WWW.CHIMIBERG.COM/ILVEROEROESEITU/

Chimiberg® - Marchio di Diachem S.p.A.

chimiberg
Altro che favole®

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	INTERVALLO SICUREZZA	NUMERO MAX TRATTAMENTI*
Agrumi	Afidi, Mosca, Aleurodidi, Cocciniglie	70-87	30 gg	1
Fruttiferi (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino)	Cocciniglia di San José (neanidi estive), Psilla, Cidia, Anarsia Carpocapsa Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori, Antonomo, Maggiolini, Tentredine Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi, Mosca della frutta <i>Aromia bungii</i> di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino Con interventi localizzati al tronco	90 60 60-90 70-90 60-90 200	Ciliegio e Susino: 7 gg Altre colture: 3 gg	3 (su Ciliegio e Susino ogni 14 gg)
Mandorlo	Afidi, Cidia, Antonomo	70-87	30 gg	3 ogni 14 gg
Vite	Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide	70-90	3 gg	3
Olivo (da olio e da mensa)	Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Tripide	80-90	O. da olio: 7 gg O. da mensa: 3 gg	3 (su O. da olio ogni 14 gg)
<i>Ortaggi a pieno campo:</i> Aglio, Carciofo, Cavoli a infiorescenza (broccoli e cavolfiori), Cavoli di Bruxelles, Cavoli cappucci, Carota, Cipolla, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Lattughe e insalata (escluso scarola/indivia a foglie larghe e baby leaf di cicora, spinacio e bietola da foglia), Melone, Patata, Pisello, Porro, Peperone, Rucola, Foglie di sedano, Asparago (solo post raccolta) <i>Fragola e ortaggi a pieno campo e serra:</i> Cetriolo, Melanzana, Pomodoro, Zucchini, Zucca	Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette	60-70 80-90	Aglio, Cipolla, Porro, Foglie di sedano, Patata, Cavoli di Bruxelles, Carota: 7 gg Altre colture: 3 gg Asparago: solo post raccolta	3 (su Carota, Pomodoro in campo, Melone, Cipolla, Aglio ogni 14 gg; su Asparago in post raccolta 2 ogni 7-14 gg; su C. di Bruxelles 2 ogni 7 gg)
Frumento, Orzo, Mais	Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi	0,6-0,8 l/ha	Frumento: 30 gg Altre colture: 3 gg	3 (su Frumento ogni 14 gg)
Cotone (uso tessile)	Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus	0,6 l/ha	15 gg	3
Erba medica	Nottue, Misurino Cavallette	0,6 l/ha 0,8 l/ha	15 gg	3
Barbabetola da zucchero	Altica, Nottue, Mamestra Lisso, Cleono	0,6 l/ha 0,8 l/ha	30 gg	1
Tabacco	Afidi, Tripidi, Nottue, Pulce (Eptrix)	0,6-0,8 l/ha	3 gg	3
Pioppo	-in vivaio: Tarlo vespa, Gemmaiola con interventi localizzati al tronco: Criptorinco, <i>Megaplatypus mutatus</i> -in pieno campo: Crisomelidi defogliatori con interventi localizzati al tronco: Criptorinco, <i>Megaplatypus mutatus</i>	90 150 60-90 150-200	n.r.	3
Floreali (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi	80-90	n.r.	3
Ornamentali e vivai (in pieno campo e serra)	Afidi, Tingide, Cimice del platano, Maggiolino, Cetonie, larve di lepidotteri	80-90	n.r.	3

NUOVA ETICHETTA modificata ai sensi del D.D. 29/12/2016 - *Se non diversamente indicato in etichetta intervenire ogni 7-14 gg


MODALITÀ D'AZIONE: insetticida attivo prevalentemente per contatto, a dosi molto basse di sostanza attiva, con rapido effetto abbattente

CODICE IRAC: 3A – applicare idonee strategie antiresistenza



CONSIGLI PER IL CORRETTO IMPIEGO

- Bagnare accuratamente la vegetazione trattata intervenendo precocemente su insetti esposti, non protetti da tessuti vegetali (per es. foglie arrotolate). In caso di colture di difficile bagnatura aggiungere idoneo coadiuvante (per es. Vector a 50 ml/ha)
- Le dosi si riferiscono a trattamenti a volume normale: per interventi a volume ridotto aumentare proporzionalmente la dose per distribuire la stessa quantità di prodotto a ettaro
- Per la protezione dei corpi idrici superficiali leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta

COMPOSIZIONE	Deltametrina 1,51% (15,7 g/l)	
REG. MIN. SALUTE	n° 10976 del 12.07.2001	
INDICAZIONI DI PERICOLO	Attenzione 	H410; EUH208; EUH401
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)	
CONFEZIONI	Flacone 250 ml (cartone 20 pz); flacone da 1 lt (cartone 10 pz); tanica da 5 lt (cartone 4 pz)	



CHIMIBERG marchio di Diachem S.p.A.
 Uffici e stabilimento: Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
 Tel. 0363 355611 - fax 0363 355610
 info@chimiberg.com www.chimiberg.com
 Azienda con Sistema di Gestione Certificato: QUALITÀ ISO 9001/15,
 SICUREZZA OHSAS 18001/07, AMBIENTE ISO 14001/04
 Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

 chimiberg®